



Nieuwsbrief april 2016

De lente is weer aangebroken! Nog even en dan kunnen de beesten de weide weer in. In deze nieuwsbrief een paar aandachtspunten.

Verduurzaming diergezondheid

Vanuit het Europese steunpakket voor de Nederlandse melkvee- en varkenshouderij is er geld vrijgekomen om ziekten als BVD, IBR en mastitis terug te dringen.

De GD biedt voor 2016 kortingen op het onderzoeken en het bestrijden van deze drie ziekten. Vanaf 2017 zal er hoogstwaarschijnlijk een verplichting komen op het vrij worden van BVD en IBR daarom is het interessant om nu al eens te informeren over de kosten en kortingen voor het onderzoeken van de situatie op uw bedrijf. Voor meer informatie kunt u terecht bij de GD.

Mineralen bij jongvee in de weideperiode

Een belangrijk aandachtspunt bij de start van het weideseizoen is het bepalen van de juiste mineralenvoorziening van het jongvee, om de groei en gezondheid ook tijdens de weidegang op peil te houden.

Onder gemiddelde Nederlandse omstandigheden bevat vers gras een tekort aan selenium, koper, kobalt en vaak ook jodium. Zonder aanvulling in het rantsoen kunnen er uiteindelijk tekorten ontstaan. Met bloedonderzoek op koper en selenium kan dit in beeld gebracht worden.

Wanneer er aan het begin van het weideseizoen vijf dieren worden getapt en bij het opstallen weer kan het verschil duidelijk worden aangetoond. Het rantsoen kan dan in het daar opvolgend jaar worden aangepast.

Enten tegen het "bloed" en zomerlongontsteking bij schapen

Er zijn al weer veel lammeren geboren. Belangrijk is om erover na te denken of de lammeren ingeënt moeten worden tegen het bloed en zomerlongontsteking.

Het "bloed" is een veel voorkomende ontsteking van de darmen en/of organen van lammeren en schapen. Het komt vooral voor bij de snelst groeiende lammeren vanaf de leeftijd van 3 weken. Meestal liggen de lammeren plotseling dood.

Bij zomerlongontsteking kan het verloop wat langzamer gaan. Snotterige neuzen en snel ademen zijn de belangrijke symptomen. Het is dan mogelijk om de lammeren te behandelen met antibiotica, maar vaccineren is veel beter.

Tegen beide ziektes kunnen zowel het moederdier (4-6 weken voor het aflammeren) als de lammeren (**vanaf 3 weken**) geënt worden. Wanneer het moederdier geënt wordt is het lam slechts enkele weken beschermd. Dieren die nog niet eerder geënt zijn worden twee keer geënt, met een tussentijd van 4-6 weken. Daarna volstaat een jaarlijks éénmalige enting.

www.degroenegrensdierenartsen.nl