



Graskruipers

Pas op voor graskruipers, oftewel grasaren. Ze zijn er weer. Groene grashalmen die langs weilanden en in de berm staan. Vers groen zijn ze niet gevaarlijk. Als ze opdrogen na maaien of uitbloeien, worden ze beige/lichtbruin en breken ze in kleine stukjes. Deze kleine stukjes hebben weerhaakjes en een vlijmscherp puntje. Ze blijven in de vacht van uw hond plakken en werken zich, door de beweging van de hond, door de huid naar binnen. Met name in de oren en tussen de tenen of voetzolen, met enorme ontstekingen als gevolg.

Houd uw hond weg bij graskruipers en kijk hem goed na, na iedere wandeling. Vooral honden met lange haren zoals spaniels, boomers etc. hebben er vaak last van.

Pinkengriep enten

Om een zo groot mogelijk voordeel te halen uit de pinkengriep enting, raden we aan om al voor het opstallen te beginnen met enten. Zeker de eerste enting, maar nog beter is het om beide entingen voor de tijd te doen. Dit betekent in veel gevallen dat er al eind augustus voor het eerst ingeënt moet worden.

Nieuwsbrief augustus 2016

Al lijkt het nog ver weg, maar voor je het weet gaan de beesten al weer op stal. Belangrijk is het om dan rekening te houden met bepaalde dingen, bijvoorbeeld wanneer begin je het best om te enten tegen pinkengriep?

Resistentie wormen bij schapen

Al een aantal jaren op rij neemt het probleem van maagdarmpwormen toe bij o.a. de schapen. Daarnaast worden er ook steeds meer wormen resistent voor de gebruikte middelen om dit te bestrijden. Belangrijk is het om af en toe mestonderzoek te laten uitvoeren om op te volgen of er problemen zijn op uw bedrijf. Indien nodig kunnen we dan overstappen naar weinig gebruikte middelen en voorkomen dat hier over enkele jaren ook een resistentieprobleem ontstaat.

Vitamine B12 en Cobalt tekort bij schapen

Door de toename van wormen bij schapen zien ook steeds meer tekort aan vitamine B12. Doordat de wormen deze ook opnemen om te groeien. Cobalt is ook nodig voor vit. B12 maar door de snelle grasgroei door de vochtige en warme zomer zit hier vaak ook een tekort van in het weiland. Het is dus belangrijk om dieren die veel last hebben van wormen ook vitamine B12 en/of cobalt bij te geven.

Mestonderzoek voor en na ontwormen

Om te controleren of het ontwormingsmiddel nog voldoende werkt raden wij aan om voor en 14 dagen na het ontwormen een mestmonster in te leveren.