



Gratis PPID-test paard

Ook dit jaar biedt de GD in samenwerking met Boehringer Ingelheim, in september en oktober, een gratis PPID test aan. PPID is een storing in de hormoonafgifte in de hersenen die onder andere hoefbevangenheid, vermageren, verminderd presteren en vachtveranderingen veroorzaken. Met name hoefbevangenheid is een ernstige aandoening. Bij 70% van de paarden die zonder duidelijke aanleiding hoefbevangen worden blijkt PPID de oorzaak te zijn. Vroeger was deze aandoening bekend als Cushing.

PPID wordt het meest gezien bij paarden ouder dan 15 jaar. Dieren die zonder duidelijke aanleiding hoefbevangen zijn of zijn geweest raden we aan om deze te laten testen op PPID. De test wordt uitgevoerd op bloed.

Longworminfectie rundvee

Dieren besmetten zich tijdens de weidegang met de larve van de longworm, na 3-4 weken zijn deze volwassen en bevinden ze zich in de longen. Deze wormen gaan eieren uitscheiden, deze worden opgehoest en ingeslikt, waarna ze via de darm de buitenwereld bereiken. Bij lichte besmetting zien we een typische hoest (gestrekte hals, tong naar buiten), vermageren en melkproductiedaling. Zware besmettingen kunnen longontsteking veroorzaken, en geven meer risico op uitbraken met pinkengriep.

Nieuwsbrief september 2016

De zomer loopt weer op zijn eind. Belangrijk is om weer maatregelen te nemen voor het opstallen, zoals scheren, ontwormen en vaccineren tegen bijvoorbeeld pinkengriep.

Mortellaro: hoe houd ik mijn jongvee vrij?

Veel bedrijven kampen met het Mortellaro probleem. Mortellaro veroorzaakt een tussenklauwontsteking die vaak regelmatig terugkeert. Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar deze aandoening en een 100% oplossing is nog steeds niet voorhanden. Hygiëne en preventie zijn de belangrijkste punten om dit probleem te verminderen.

Mortellaro neemt vooral toe in de periode na het afkalven. Ook is gebleken dat wanneer ze als pink al Mortellaro oplopen, het risico op problemen in een latere levensfase veel groter is. Een goede reden om te proberen jongvee Mortellaro vrij te houden.

Belangrijk is om jongvee niet samen te huisvesten met koeien. Vaak zien we dat droge koeien bij het jongvee worden gehuisvest, helaas vergroot dit de kans op overdracht naar het jongvee en ook de droge koeien krijgen sneller klauwproblemen doordat er een hogere infectiedruk ontstaat.

Belangrijk is om enkel met schone laarzen de jongveestal in te gaan. Advies is dan ook om bij de stal een mogelijkheid te hebben om laarzen af te spoelen en eventueel een ontsmettingsbak te gebruiken. Pas wel op dat deze laatste niet verandert in een besmettingsbak. Maak deze regelmatig schoon en vervang de vloeistof!