



Verplichte bestrijding IBR in 2018 van kracht

Na een lange periode van overleg is een paar weken geleden bekend geworden dat de verplichte landelijke bestrijding van IBR in 2018 van start gaat. De overheid gaat de bestrijding vastleggen in de wet, zodat alle sectoren verplicht mee moeten doen. Deze regelgeving moet komende maanden meer over bekend worden. In de praktijk houdt dit in dat alle besmette rundveebedrijven verplicht moeten gaan vaccineren. Dit geldt ook voor geïmporteerd rundvee, tenzij ze IBR vrij zijn. Het uiteindelijke doel is toe te werken naar een officiële Europese vrij status op het gebied van IBR.

In tegenstelling tot IBR wordt BVD niet meegenomen in bovenstaande wettelijke bestrijding. De reden is dat er in Europa geen status op dit gebied te verkrijgen is. Daarnaast hebben de Nederlandse zuivelondernemingen het voornemen de bestrijding van BVD mee te nemen in de leveringsvoorwaarden. Meer informatie kunt u vinden op www.ibrbvd.nl.



Nieuwsbrief juli 2017

De eerste warme dagen zitten er alweer op. Dit betekent dat ook het ongedierte weer volop aanwezig is. In de vorige nieuwsbrief kwam het ontwormen van veulens en lammeren al aan bod. Hier belichten we het belang van mestonderzoek.

Mestonderzoek

Door middel van mestonderzoek kunt u kijken of uw dieren wormeitjes uitscheiden en het nodig is de dieren te behandelen. De larven en eitjes zijn niet met het blote oog te zien.

Hoe verser het monster hoe beter de resultaten. Het is dus belangrijk om de mest zo vers mogelijk bij ons binnen te brengen. Het best kun u van meerdere dieren tegelijk mest binnenbrengen. Wel in aparte zakjes.

Wij zullen de monsters vervolgens onder de microscoop bekijken. Vervolgens kunnen wij u een advies op maat geven hoe de dieren moeten worden ontwormd. Omdat er al veel resistentie is tegen wormmiddelen is het verstandig om 14-21 dagen na het ontwormen nog eens mest te laten onderzoeken of het middel de wormen heeft gedood.

Acute mastitis bij warm weer

Tijdens de warme dagen ligt ook het gevaar van **acute mastitis** op de loer. Bij de hogere temperaturen groeien de bacteriën sneller. Besteed dus extra aandacht aan de hygiëne op stal en zorg voor schone ligboxen.