

**Veranderingen binnen het team**

Zoals sommigen van jullie al zullen weten heeft Jasmine besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Per 1 maart heeft zij ons team dan ook verlaten. Wij willen haar bedanken voor de inzet van afgelopen jaren en wensen haar heel erg veel succes met de verdere loopbaan.

12 maart verwelkomen wij een nieuwe collega, Lisa Algie. En in april verwelkomen we nog een dierenarts. In de volgende nieuwsbrieven zullen zij zich aan u voorstellen.

**Snel test kalverdiarree**

Diarree komt de laatste weken weer veel voor. Vooral de cryptosporidium steekt weer de kop op. Wij raden aan om te testen om wat voor diarree het gaat. Dit kan zowel tijdens een visite of u kunt mest inleveren op de praktijk. Bij kalveren tot 8 weken wordt de mest onderzocht op rota- en coronavirus, cryptosporidium, E-coli en Giardia.

**Verskillende pijnstillers/koortsremmers gebruikt bij rundvee**

In de praktijk wordt steeds meer gebruik gemaakt van pijnstillers. Soms in combinatie met antibiotica en soms als enige behandeling. Hieronder vindt u een kort overzicht van de meest gebruikte middelen bij rundvee.

Naam	Indicatie	Toediening	Opmerking	Wachttijd
Flunixin Meglumine (Finadyne transdermaal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorts bij luchtweginfecties</li> <li>• Koortsverlaging acute mastitis (Coli)</li> <li>• Vermindering pijn bij klauwproblemen</li> </ul>	Pour on: 1 ml per 15 kg LG	Verlaging van koorts en pijn in 6 uur. Werkt 12 uur.	M: 1 ½ d V: 7 d
Ketoprofen (Ketofen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorts, pijn en ontsteking bij luchtweginfecties en mastitis</li> </ul>	IM,SC: 3 ml per 100 kg LG ged. 1-3 dagen	Geen wachttijd melk. Werking in 30 minuten. Werkt 12-24 uur.	M: 0 d V: 4 d
Meloxicam (Meloxidyl, Novacam)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontstekingsremmer en pijnstiller in zowel acute als chronische gevallen</li> <li>• Diarree bij kalveren</li> <li>• Onthoornen kalveren</li> </ul>	SC: 2,5 ml/100 kg LG	Werking na 4 uur. Bijna 2 dagen werkzaam.	M: 5 d V: 15 d
Carprofen (Rimadyl Cattle, Carprocow)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klauwaandoeningen</li> <li>• Luchtweginfecties en Mastitis</li> </ul>	SC: 1 ml /35 kg LG	3 dagen werkzaam	M: 0 d V: 21 d